




Weidevogels Midden-Delfland 2023




Kievitsnest met extra veel hooi (foto: Eike de Boer)

Weidevogelseizoen 2023

Het voorjaar van 2023 begon in Midden-Delfland goed voor de weidevogels. Het was koel en nat. Dat zorgde ervoor dat veel vogels zich vestigden in de weilanden. Door de nattigheid gebruikten kieviten meer hooi in hun nesten dan gebruikelijk. De maand mei is voor het succes van weidevogels altijd zeer bepalend. Begin mei was er nog niet veel gemaaid en de 1e weken van mei waren er nog steeds veel vogels aanwezig. Maar half mei namen de aantallen echter snel af en werd het stiller in de polders. Veel percelen werden gemaaid en het werd droog. Droogte is niet bevorderlijk voor het aantal insecten. Terwijl in deze periode de kuikens juist veel insecten moeten eten om te kunnen groeien.

Grutto's die vroeg gingen broeden deden het goed. Maar tot 15 mei zijn er nog nieuwe legfels van grutto's gevonden. Hierdoor waren nog tot eind juni jonge grutto's in de polder. Daarvan zijn er veel minder vliegvlug geworden dan van de vroege grutto's. Tureluurs deden het goed bij de plasdraspompen. 2023 lijkt helaas niet het topjaar te zijn geworden waar het in eerste instantie naar uit leek te zien.

Weidevogelpopulatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland monitoring begin mei (ronde 2 - ANLb gebied)



Van predatoren hebben de vogels dit jaar wel minder te vrezen gehad. Door een aantal slechte muizenjaren op rij, zijn er minder predatoren. Dit jaar zijn er meer muizen en hebben de overgebleven predatoren juist veel muizen te eten en hoefden kuikens niet op het menu te staan.

2023 telde veel slobeenden en veel gele kwikstaarten. Veldleeuweriken zitten vooral in natuurgebieden en bij biologische boeren. Zes paar steltkluten hebben een broedpoging gedaan en op drie plekken zijn patrijzen gesignaleerd. Helaas zijn er maar weinig jonge scholeksters gezien. Niet voor niets was 2023 het Jaar van de Scholekster, om aandacht te vragen voor en extra onderzoek te doen naar de achteruitgang van deze soort. Doordat scholeksters hun jongen voeren zijn ze bijvoorbeeld veel zichtbaarder voor predatoren.

Kievit-kuiken (foto: Renata de Wit)




Coördinatoren

John Kleijweg - tel. 06 53 77 43 48
 Martin van Holsteijn - tel. 06 54 91 30 92
 Arjen Keijzer - tel. 06 42 25 22 50
coordinator@vockestaert.nl

Weidevogelpakketten

Wanneer agrariërs zich in willen zetten voor weidevogels, kunnen zij hiervoor bij het Agrarisch Collectief ‘ANLb-pakketten’ afsluiten. De voor weidevogels belangrijke pakketten zijn:

- Een rustperiode tot 1, 8 of 15 juni, waarbij het maaien wordt uitgesteld tot het uitkomen van nesten en vertrek van kuikens.
- Kruidenrijk grasland, lijkt hierop, maar kent ook een beperking in bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen met als doel meer insecten (voedsel) aan te trekken en beter doorloopbaar gras voor kuikens te creëren.
- Nat biotoop behelst (greppel)plasdras en hoog slootpeil. Deze maatregelen hebben een zeer gunstig effect en geven voedsel en veiligheid voor zowel volwassen als jonge weidevogels en eenden.
- Bij voorweiden en extensief beweiden wordt vee ingezet om een optimaal foerageergebied voor (Kievits)kuikens te creëren.
- Bij Last Minute beheer wordt op plekken waar veel vogels zitten het maaien alsnog uitgesteld.
- Vogelakker zijn maatregelen (meestal) rondom bouwland ten behoeve van akkervogels.
- Ruige mest kan uitgereden worden op percelen met zwaar beheer ter bevordering van het bodemleven.



Bloemrijke akkerrand (foto: Cynthia Visser)

Randje over?

Niet alles voor weidevogels hoeft volvelds te gebeuren. Er zijn ook maatregelen die goed in een strook of rand kunnen. Denk bij het telen van maïs eens aan een kruidenrijke akkerrand! Deze worden ingezaaid met een mengsel van grassen, kruiden en granen (vergoeding €3961,97/ha). Akkerranden brengen het mozaïekpatroon terug in het cultuurlandschap en zijn positief voor weide- en akkervogels.

Voor kieviten hoeft een rand niet per se ingezaaid te worden. Een zogenaamde kievitsstrook (vergoeding €3936,97/ha) blijft braak liggen van 15 maart tot 15 juli. In de spontane vegetatie kunnen kievitkuikens goed voedsel en dekking vinden. Deze braakliggende stroken kunnen ook midden op het perceel liggen. Een mooie vervolgstap is om deze strook in het najaar in te zaaien met een kruidenrijk akkermengsel.

In grasland kan een kruidenrijke graslandrand worden ingezet (vergoeding €1171,31/ha of €1375,71/ha). In de rand moeten 4 of 8 indicatorsoorten aanwezig zijn. Bemest de rand niet, maar maai hem naar eigen inzicht minimaal 1 keer per jaar. Ligt de rand langs de rand van een perceel, dan mag hij mee beweden worden.

Meer informatie over deze pakketten en de voorwaarden leest u op:

<https://www.vockestaert.nl/diensten/weidevogels/agrarisch-collectief-midden-delfland/beheerpakketten/>

Greppel-plasdras gezocht eind mei!

De weidevogels zijn ontzettend blij met de inmiddels ruim 40 plasdrassen die Midden-Delfland telt. Hartelijk dank aan de boeren en vrijwilligers die dat mogelijk maken! Veel plasdrassen zijn nat vanaf half februari tot 15 mei. Nu de voor-jaren steeds droger lijken te worden, merken we dat juist eind mei de nattigheid van een greppel-plasdras van cruciaal belang is voor de overleving van kuikens. Als deze er niet is, lijkt veel inzet eerder in het jaar voor niets te zijn geweest. Daarom zoeken we met spoed extra ‘late greppel-plasdrassen’. Deze zijn al nuttig voor drie weken en kunnen worden afgesloten in de periode 1 mei tot 1 augustus (vergoeding afhankelijk van aantal weken €789,39/ha - €2105,04/ha). Denk hierbij ook aan land dat al gemaaid of beweid is geweest begin mei.



Grutto (foto: Renata de Wit)

Interview - De oevers van Aad Ammerlaan

Aad, jij maait de eerste 1 à 1,5 meter uit de slootkant niet mee. Vertel, hoe is dat zo gekomen?

Ik laat op al mijn percelen de slootkant inderdaad staan. Dat is een beetje geïnspireerd door een collega-boer en de natuurvriendelijke oevers (NVO) van het Hoogheemraadschap van Delfland. In de randen kunnen de jonge beestjes, zoals hazen en eenden, wegkruipen. Ik zie overigens meer diversiteit bij ons zelf dan bij de NVO van Delfland. Zelf heb ik toch niet zo veel aan het gras in de slootkant. Nu het blijft staan, valt het gras met maaien en schudden terug op het perceel en niet in de sloot.

Hoe beheer je de rand?

Er komt uiteraard geen mest op, want dat mag niet. In de loop van het seizoen, meestal aan het einde, klepel ik de randen. Verder kost het geen extra werk.

Waar geniet je het meeste van?

Inmiddels staan er veel verschillende bloemen en kruiden en zie ik de zwaluwen jagen boven de randen. Dat is een mooi gezicht. Toen ik in een jaar toch een keer de rand mee had gemaaid, waren die gelijk weg. Wat het precies doet in mijn VEM en ruw as weet ik niet, want ik doe het overal. Maar ik geloof zeker dat het daar ook een positief effect op kan hebben.

Nog nadelen?

Er is wel een kans dat onkruid vanuit de rand je perceel op komt. Dat moet je wel in de gaten houden. En ik krijg weleens commentaar dat het er niet zo netjes uit ziet. Dat hoor je natuurlijk liever niet. Maar het maaien van de kant dient voor mij geen doel en zo help je de biodiversiteit een beetje.



Legselbeheer (foto: Bas Blok)



Bloemen en kruiden langs de oevers van Aad (foto: Aad Ammerlaan)